


MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO



## INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS

1. Esta prova é constituída de **70** itens de múltipla escolha distribuídos em **28** páginas numeradas, excluindo esta capa e **01** cartão de respostas. A prova está assim dividida:

a. Conhecimentos Gerais (Itens numerados de **01** a **30**):

- Língua Portuguesa, Geografia do Brasil, História do Brasil e Língua Estrangeira

(Inglês ou Espanhol)

b. Conhecimentos Específicos (Itens numerados de **31** a **70**):

-Enfermagem.

## CONCURSO DE ADMISSÃO / 2015 AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR / 2016

### PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**BOA PROVA!!!**

Exemplo: NÚMERO DE INSCRIÇÃO 017396.

**INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS**  
(CA/2015 AO CFO/QC/2016)

**1. ORIENTAÇÕES GERAIS:**


- a. Utilize SOMENTE caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- b. Preencha COMPLETAMENTE os alvéolos; e
- c. NÃO ultrapasse os limites dos alvéolos.

**2. PREENCHIMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:**

- a. Preencha o ANO do processo seletivo, o NOME da sua ÁREA, o seu NOME COMPLETO, a sua Guarnição de Exame (GE) e o número da sua SALA.

Vejamos o exemplo: candidato com NÚMERO DE INSCRIÇÃO 017396, FULANO DE TAL, realizará a prova para ENFERMAGEM no COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO, na sala nº 500.

MINISTÉRIO DA DEFESA – EXÉRCITO BRASILEIRO	
DECEX	EsFCEx
CARTEA DESMIL	
ÁREA: ENFERMAGEM	
ANO: 2015	
NOME: FULANO DE TAL	
GE: Rio de Janeiro - C M R J	
SALA: 500	



**3. PREENCHIMENTO DAS RESPOSTAS:**

- a. O cartão contém o número dos itens e as alternativas possíveis (A, B, C, D e E); e  
b. Para cada item só é permitida a marcação de uma única resposta.

Atenção para o tempo limite da prova, pois não será concedido qualquer tempo extra para o preenchimento do Cartão de Respostas!

[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Veja o exemplo ao lado:

O candidato marcou :

- para o item 01 a letra A
- para o item 02 a letra C
- para o item 03 a letra D


- b. Preencha o seu número de inscrição na primeira coluna vertical à esquerda. Agora, realize a marcação de cada algarismo deste número no alvéolo correspondente da coluna da direita.

**4. ASSINATURA:**

Assine o seu nome dentro do espaço reservado para isso. Evite ultrapassar os limites.  
Exemplo: candidato cujo nome é FULANO DE TAL.

*Fulano De Tal*

A S S I N A T U R A



## ENFERMAGEM

31. Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa que dá sentido correto ao parágrafo.

“Classicamente, a auscultação cardíaca é realizada em pontos do tórax nos quais é captado o ruído das valvas. Deve-se dar uma especial atenção às áreas onde a sua audibilidade for melhor, apesar de não corresponderem à região onde se localizam anatomicamente as valvas. Essas áreas chamadas de focos de ausculta, são: o \_\_\_\_\_, que corresponde ao choque de ponta e está localizado no cruzamento do 5º espaço intercostal esquerdo com a linha hemiclavicular; o \_\_\_\_\_, localizado na base do apêndice xifoide; o \_\_\_\_\_, que fica no 2º espaço intercostal à direita, junto ao esterno; e o \_\_\_\_\_, no 2º espaço intercostal à esquerda, junto ao esterno.”

- (A) foco mitral – foco pulmonar – foco tricúspide – foco aórtico  
(B) foco pulmonar – foco mitral – foco aórtico – foco tricúspide  
(C) foco tricúspide – foco aórtico – foco mitral – foco pulmonar  
(D) foco mitral – foco tricúspide – foco aórtico – foco pulmonar  
(E) foco aórtico – foco tricúspide – foco pulmonar – foco mitral

32. Quanto à Resolução 293 de 2004 do Conselho Federal de Enfermagem que fixa e estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas unidades assistenciais das instituições de saúde e assemelhados:

- (A) Para unidades especializadas com exceção da psiquiatria e oncologia, deve-se classificar o cliente tomando como base as características assistenciais específicas, adaptando-se ao sistema de classificação de pacientes.  
(B) Para efeito de cálculo deverá ser observada a cláusula contratual quanto à carga horária.  
(C) Para berçário e unidade de internação em pediatria, caso não tenha acompanhante, a criança maior de seis anos e o recém nascido devem ser classificados com necessidades de cuidados intermediários.  
(D) O quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido de um índice de segurança técnica inferior a 10%.  
(E) O quantitativo de Enfermeiros para o exercício de atividades gerenciais, educação continuada e comissões permanentes, deverá ser dimensionado de acordo com a classificação dos clientes segundo o sistema de classificação de pacientes.

33. O Programa Nacional de Imunização organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. (Brasil, 2014, p.14). Sobre os fatores relacionados à pessoa vacinada que influenciam a resposta imune são:

- (A) idade, gestação, via de administração.  
(B) amamentação, idade, pacientes imunodeprimidos.  
(C) dose e esquema da vacinação, pacientes imunodeprimidos, gestação.  
(D) amamentação, gestação, via de administração.  
(E) pacientes imunodeprimidos, amamentação, dose e esquema de vacinação.

34. A auditoria nas organizações de saúde fornece aos administradores uma forma de aplicar o processo de controle para determinar a qualidade dos serviços oferecidos. As auditorias mais empregadas no controle de qualidade são as de resultados, processo e estrutura (MARQUIS & HUSTON, 2010). Analise as afirmativas sobre os tipos de auditorias nos espaços organizacionais de saúde, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) As auditorias de processo são feitas no momento em que o paciente recebe os serviços se estendendo para todo o processo de atendimento. Pode ser retrospectiva e prospectiva.
- ( ) As auditorias de resultados determinam os resultados ocorridos, se houver, em consequência de determinadas intervenções de enfermagem para pacientes.
- ( ) As auditorias de estrutura monitoram a estrutura ou o cenário em que ocorre o atendimento ao paciente (como finanças, estrutura dos serviços de enfermagem, registros médicos e estrutura do ambiente).

35. Foi prescrito um soro glicosado de 500ml a 10%. Entretanto, no posto de enfermagem há apenas soro glicosado de 500ml a 5% e ampolas de glicose a 50% com 10ml. Quantas ampolas de Glicose a 50% com 10ml serão necessárias para essa transformação?

- (A) 15 ampolas.
- (B) 10 ampolas.
- (C) 05 ampolas.
- (D) 03 ampolas.
- (E) 02 ampolas.

36. Paciente hospitalizado por sepse secundário a pneumonia bacteriana grave evolui com sangramento importante, desencadeando um quadro de coagulação intravascular disseminada (CID). Nesses casos deve-se indicar a administração de hemocomponentes, principalmente:

- I. Concentrado de hemáceas.
- II. Concentrado de granulócitos.
- III. Plasma fresco.
- IV. Concentrado de plaquetas.

Das afirmativas acima:

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I e II estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) F – F – F.



37. Atualmente, o ambiente em serviços de saúde tem sido foco de especial atenção para a minimização da disseminação de microrganismos, pois pode atuar como fonte de recuperação de patógenos potencialmente causadores de infecções relacionadas à assistência à saúde, como os microrganismos multirresistentes. (BRASIL, 2010). Analise as afirmativas sobre alguns dos fatores que favorecem a contaminação do ambiente dos serviços de saúde, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Manutenção de superfícies secas.  
 ( ) Utilização de técnicas básicas pelos profissionais de saúde.  
 ( ) Revestimentos seguros e limpos.

- (A) V – V – V.  
 (B) V – F – V.  
 (C) F – V – V.  
 (D) F – V – F.  
 (E) F – F – F.

38. A definição das áreas dos serviços de saúde foi feita considerando o risco potencial para a transmissão de infecções, sendo classificadas em áreas críticas, semicríticas e não-críticas. (BRASIL, 2010). Em relação a classificação das áreas dos serviços de saúde e sua definição, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

#### Áreas

#### Definição/Exemplos

1. Críticas ( )  
 2. Semicríticas  
 3. Não-críticas

- ( ) São todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infeciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infeciosas. São exemplos desse tipo de área: enfermarias e apartamentos, ambulatórios, banheiros, posto de enfermagem, elevador e corredores.

- ( ) São todos os demais compartimentos dos estabelecimentos assistenciais de saúde não ocupados por pacientes e onde não se realizam procedimentos de risco. São exemplos desse tipo de área: vestíario, copa, áreas administrativas, almoxarifados, secretaria, sala de costura.

- ( ) São os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos. São exemplos desse tipo de área: Centro Cirúrgico (CC), Centro Obstétrico (CO), Unidade de Diálise, Laboratório de Análises Clínicas, entre outros.

- (A) 2 – 3 – 1  
 (B) 1 – 3 – 2  
 (C) 3 – 1 – 2  
 (D) 3 – 2 – 1  
 (E) 2 – 1 – 3

39. Em um atendimento a uma vítima que sofreu queimaduras em ambiente fechado deve-se sempre considerar possível exposição ao monóxido de carbono (CO). Assim, as medidas indicadas para pacientes com suspeita de exposição ao CO são:

- I. Oxigênio em alto fluxo, através de máscara unidirecional e sem recirculação.
- II. Solicitar gasometria arterial e medir inicialmente os níveis de carboxihemoglobina.
- III. Realizar a intubação endotraqueal profilática e imediata no paciente mesmo na ausência de sinais e sintomas.
- IV. Solicitar Rx de tórax para verificar lesão pulmonar previamente a introdução da oxigenoterapia de médio fluxo, através de máscara unidirecional e com recirculação.

Das afirmativas acima:

- (A) Somente I e III estão corretas.  
(B) Somente II e III estão corretas.  
(C) Somente I e II estão corretas.  
(D) Somente II e IV estão corretas.  
(E) Somente III e IV estão corretas.

40. Em relação às possíveis indicações da drenagem torácica e suas respectivas definições, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

#### Definição

#### Indicação

- |                |                          |  |
|----------------|--------------------------|--|
| 1. Pneumotorax | <input type="checkbox"/> | Coleção de sangue no espaço pleural.                                       |
| 2. Hemotorax   | <input type="checkbox"/> | Coleção de ar no espaço pleural. Pode ser aberto, fechado ou hipertensivo. |
| 3. Quilotórax  | <input type="checkbox"/> |  |
| 4. Empiema     | <input type="checkbox"/> | Coleção de pus no espaço torácico.   |

Coleção de pus na cavidade pleural.

- (A) 1 – 2 – 4 – 3  
(B) 1 – 3 – 2 – 4  
(C) 4 – 3 – 1 – 2  
(D) 4 – 3 – 2 – 1  
(E) 2 – 1 – 3 – 4

41. Estima-se para o ano de 2050 que existam cerca de dois bilhões de pessoas com sessenta anos ou mais no mundo, a maioria delas vivendo em países em desenvolvimento. No Brasil, estima-se que existam, atualmente, cerca de 17,6 milhões de idosos. (BRASIL, 2007). O envelhecimento populacional, portanto, é uma resposta à mudança de alguns indicadores de saúde, especialmente:

- (A) queda da taxa de fecundidade, da mortalidade e da expectativa de vida.  
(B) queda da fecundidade e da mortalidade infantil e aumento do índice de crescimento populacional.  
(C) queda da fecundidade e da mortalidade e o aumento da esperança de vida.  
(D) queda da mortalidade, aumento da escolaridade das pessoas idosas e índice de crescimento populacional.  
(E) queda da mortalidade, da taxa de fecundidade e do índice de envelhecimento.



42. A avaliação da pessoa idosa nos serviços de Atenção Básica tem por objetivo a avaliação global como ênfase na funcionalidade. (BRASIL, 2007). Em relação aos instrumentos que devem ser utilizados para avaliação da pessoa idosa, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

- | Instrumento                                | Objetivo  |
|--|---|
| 1. Escala de Lawton                        | ( ) Medir o grau de solicitação de cuidados de terceiros que a pessoa com deficiência exige para realização de tarefas motoras e cognitivas.  |
| 2. Medida de Independência Funcional (MIF) | ( ) De acordo com o grau de limitação apresentado para o desempenho das Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs) é possível determinar se a pessoa idosa é ou não capaz de manter uma vida independente. |
| 3. Mini Exame do Estado Mental (MEEM)      | ( ) É o teste utilizado para avaliar a função cognitiva.  |
| 4. Questionário de Pfeffer (QPAF)          | ( ) Verificar a presença e a severidade de declínio cognitivo por meio da avaliação da funcionalidade e consequente mente da assistência requerida.   |
43. Ana tem 45 anos de idade e é divorciada. Tem três filhos de 10, 12 e 14 anos de idade. Trabalha na secretaria de educação do estado e faltou quatro vezes nos últimos dois meses por doença. Perdeu cerca de oito quilos nos últimos dois meses, passa muito tempo na cama, mas ainda assim se sente exausta ‘o tempo todo’. Na entrevista de admissão ao centro de apoio psicosocial, parecia oprimida e triste, tinha lágrimas nos olhos, mantinha a cabeça baixa e fazia pouco contato pelo olhar. Respondia às perguntas da(o) enfermeira(o) por monossílabas. Ana possui quatro sintomas que levam ao diagnóstico de transtorno depressivo maior conforme os Critérios do DSM-IV-TR, são eles:
- (A) dificuldade para pensar, ideias suicidas, alteração no sono e cansaço.  
 (B) anedonia, agitação, alteração do peso e delírio.  
 (C) alteração no sono, ideias suicidas, cansaço e humor deprimido.  
 (D) anedonia, alteração do peso, cansaço e humor deprimido.  
 (E) ansiedade, irritabilidade, cansaço e delírio.
44. No Brasil, dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), de 2011, mostram que a prevalência de diabetes (DM) autorreferida na população acima de 18 anos aumentou de 5,3% para 5,6%, entre 2006 e 2011. Analise as afirmativas sobre os exames de rotina para a pessoa com DM, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Glicemia de jejum e HbA1C.  
 ( ) Colesterol total (CT); HDL e triglicerídeos (TG).  
 ( ) Creatinina sérica; Exame de urina tipo 1, se necessário e fundoscopia.
- (A) V – V – V.  
 (B) V – F – V.  
 (C) F – V – V.  
 (D) F – V – F.  
 (E) F – F – F.
- (A) 1 – 2 – 4 – 3  
 (B) 1 – 3 – 2 – 4  
 (C) 4 – 3 – 1 – 2  
 (D) 4 – 3 – 2 – 1  
 (E) 2 – 1 – 3 – 4

45. Em relação à ausculta das bulhas cardíacas, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assimale a alternativa com a sequência correta.

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Bulhas Cardíacas</b>         | <b>Relação</b>   |
| 1. Primeira Bulha Cardíaca (B1) | ( ) Tem ligação com o fechamento das valvas mitral e tricúspide. |
| 2. Segunda Bulha Cardíaca (B2)  | ( ) Marca o início da sístole.                                   |

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Bulhas Cardíacas</b>         | <b>Relação</b>   |
| 1. Primeira Bulha Cardíaca (B1) | ( ) Tem ligação com o fechamento das valvas mitral e tricúspide. |
| 2. Segunda Bulha Cardíaca (B2)  | ( ) Marca o final da sístole e o início da diástole.             |

46. Sobre a redução de danos presente no conjunto de ações da Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2013):

- (A) um aspecto relevante na utilização de abordagens de redução de danos para problemas de álcool e outras drogas, é a descentralização no que a pessoa que busca ajuda deseja.
- (B) operar em uma lógica de redução de danos também exige trabalhar unicamente com a pessoa que usa drogas, porque é a mesma que procura os serviços de Atenção Básica.
- (C) atuar em uma perspectiva da redução de danos na Atenção Básica pressupõe a utilização de tecnologias relacionais centradas no acolhimento empático, no vínculo e na confiança como dispositivos favorecedores da adesão da pessoa.
- (D) uma maneira de aproximar-se destes usuários é por meio de visitas domiciliares e agendamentos de consultas para uma avaliação clínica mais geral, focando a abordagem sempre no seu problema com as drogas.
- (E) a adoção da perspectiva da redução de danos pressupõe um cuidado tutelar, disciplinador, prescritivo e restritivo que estabelece, a partir de critérios externos, aquilo que a pessoa deve fazer e como deve se comportar.

- (A) 2 - 2 - 1 - 1 - 2  
(B) 2 - 2 - 1 - 2 - 1  
(C) 1 - 1 - 2 - 1 - 2  
(D) 1 - 2 - 1 - 2 - 1  
(E) 1 - 1 - 2 - 2 - 1



47. João tem 10 anos e participa de um grupo de escoteiros da sua cidade. Durante uma caminhada com o grupo nas matas da região Sul do Brasil, João sente uma picada forte no tornozelo. Ele, inicialmente, não valoriza e continua a seguir o grupo. Cerca de uma hora depois deste incidente, o grupo decide descansar e João procura o supervisor por estar sentindo dor no local da picada e na região inguinal. Seu supervisor ao avaliar a perna de João percebe edema tenso, equimose e adenomegalia regional, que progredem ao longo do membro acometido, suspeitando, dessa forma, de um acidente por uma cobra peçonhenta. Sobre acidentes por animais peçonhentos:

- I. Manifestações sistêmicas podem estar presentes com alteração da coagulação sanguínea e sangramentos espontâneos (gengivorrágia, equimoses e hematomas pós-trauma, hematuria).
  - II. O soro ou antiveneno deve ser específico para cada tipo de acidente. Após a infusão da soroterapia deve-se estar atento aos sinais e sintomas de reações alérgicas muito tardias, a partir de 06 semanas.
  - III. O tempo de coagulação (TC) constitui ferramenta útil para a confirmação dos acidentes.
  - IV. O uso de antiinflamatórios e heparina nesses casos tem sido eficiente, neutralizando os efeitos nocivos do veneno.
- Das afirmativas acima:
- (A) Somente I e III estão corretas.
  - (B) Somente II e III estão corretas.
  - (C) Somente I e II estão corretas.
  - (D) Somente II e IV estão corretas.
  - (E) Somente III e IV estão corretas.

48. A AIDS é uma doença que representa um dos maiores problemas de saúde da atualidade, em função do seu caráter pandêmico e de sua gravidade (BRASIL, 2010, p.77). Sobre a vigilância epidemiológica nos casos de Aids:

- (A) a Zidovudina intravenosa deverá ser administrada a todas as parturientes no momento do parto e, a Zidovudina solução oral para todos os recém nascidos expostos ao HIV, durante três semanas.
- (B) as gestantes portadoras do HIV deverão iniciar a profilaxia da transmissão vertical a partir da 10ª semana, com terapia ARV tripla.
- (C) algumas doenças são indicativas de AIDS para as quais é requerido o diagnóstico definitivo, entre elas estão: leucemia mielóide crônica, dengue e herpes zoster.
- (D) notifícasse o caso confirmado de AIDS, mediante o preenchimento da Ficha de Notificação/Investigação de AIDS, adulto, disponível no SINAM, cabendo essa atribuição exclusivamente ao médico.
- (E) o objetivo da vigilância epidemiológica é de acompanhar a tendência temporal e espacial da doença, de infecções e comportamentos de risco, visando orientar as ações de prevenção e controle do HIV/ AIDS e, consequentemente, reduzir a morbimortalidade associada à AIDS.

49. A artroplastia é um procedimento cirúrgico para:

- (A) substituição de articulação.
- (B) plástica vaginal.
- (C) remoção da glândula prostática.
- (D) retirada do rim.
- (E) remoção de nódulos linfáticos cervicais.

50. Sobre a Resolução 311 de 2017 do Conselho Federal de Enfermagem que aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem:

- (A) o Profissional de Enfermagem deverá responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, limitando quando tiver sido praticada em equipe.
- (B) é direito do Profissional de Enfermagem recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
- (C) é proibido assinar as ações de enfermagem que não executou, no entanto outro profissional da mesma categoria pode fazê-lo quando este visualizar a ação.
- (D) cabe unicamente ao Conselho Federal de Enfermagem a fiscalização de exercício profissional, pertencendo ao Profissional de Enfermagem a execução de atos contrários ao Código de Ética.
- (E) o Profissional de Enfermagem nunca poderá suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor saúde, pois poderá caracterizar abandono de trabalho.

51. Dentre as funções administrativas encontram-se as atividades de planejamento, organização, direção, controle e avaliação. A(o) enfermeira(o) desenvolve atividades administrativas de controle quando:
- (A) mantém atualizados e conservados os relatórios e registros das atividades de organização.
- (B) delega, motiva, lidera, supervisiona, coordena e controla o seu serviço e os seus subordinados.
- (C) elabora ou auxilia na elaboração de normas, fluxograma, manual, organograma, regimentos e rotinas.
- (D) aplica a metodologia científica, associada ao conhecimento técnico e à habilidade do enfermeiro, a fim de ajudar a modificar a situação problema do paciente.
- (E) determina um modelo de dotação de pessoal, compatível com a realidade do serviço e de um sistema de escala que atenda às necessidades do serviço e do trabalhador.

52. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo.

“ \_\_\_\_\_ tem como ênfase à tarefa e como foco os padrões da prática. Daí a existência da relação entre a qualidade do enfermeiro e a qualidade do cuidado oferecido. Os padrões da prática podem ser encontrados nos planos de cuidado do paciente, nos manuais de procedimento ou nas declarações do protocolo de enfermagem. Este tipo de auditoria pode ser utilizada para que seja estabelecido se as pressões sanguíneas foram verificadas, conforme rotina estabelecida.”

- (A) Auditoria de estrutura  
(B) Auditoria do processo  
(C) Auditoria de resultados  
(D) Auditoria interna  
(E) Auditoria externa

53. Analise as afirmativas sobre cálculo, distribuição e dimensionamento do pessoal de enfermagem nos diferentes setores de um hospital, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Os servidores com 50 anos ou mais de idade e/ou 20 anos ou mais de exercício profissional deverão ser dispensados das escala de plantão noturno.  
( ) Deverá ser previsto 03(três) enfermeiros para atividades gerenciais, com atuação predominante nas áreas de coordenação, controle e treinamento, já contempladas no sistema de cálculo.  
( ) Na distribuição percentual do total de profissionais de Enfermagem, para assistência semi-intensiva, deve-se observar o Sistema de Classificação de Paciente e a proporção de 42 a 46% de Enfermeiros para os demais profissionais - Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.  
(A) V – V – V.  
(B) V – F – V.  
(C) F – V – V.  
(D) F – F – V.  
(E) F – F – F.



54. Transfusão sanguínea consiste em um evento irreversível que acarreta riscos potenciais ao receptor. Esses riscos constituem as reações transfusionais que podem ocorrer durante ou após a administração da transfusão. Assinale a alternativa correta acerca dos sinais e sintomas, conduta clínica e prevenção das principais reações transfusionais imediatas.

- (A) em casos de embolia aérea, deitar o paciente em decúbito dorsal, com as pernas acima da cabeça.
- (B) a depender da reação transfusional não utilizar pré-medicações, sangue desleucocitado, irradiado ou lavado.
- (C) em casos de reação urticáiforme ou sobrecarga circulatória, faz-se necessário a coleta de amostra pós-transfusional.
- (D) na presença de sinais e sintomas de sobrecarga volêmica, como cianose, dispneia e edema pulmonar oferecer suporte de O<sub>2</sub> e diuréticos conforme prescrição médica.
- (E) a ocorrência de choque em combinação com tremores, hipotensão, febre sugere contaminação viral, podendo também acompanhar o quadro de hemólise crônica.

55. A dor é uma experiência sensorial e emocional associada à lesão tissular real ou potencial. Considerada como 5º Sinal Vital, é importante que a(o) enfermeira(o) conheça o processo fisiopatológico da dor e suas consequências, bem como os métodos usados para seu tratamento. Assinale a alternativa correta acerca das especificidades deste 5º Sinal Vital:

- (A) a dor é caracterizada de acordo com a sua duração, profundidade e etiologia.
- (B) a dor é caracterizada de acordo com sua etiologia, como dor pélvica, cefaléia e dor torácica.
- (C) são 03 (três) os fatores a serem considerados em um histórico completo da dor: a intensidade, a quantidade e a regulação atemporal.
- (D) o papel da(o) enfermeira(o) no tratamento da dor inclui capacitar a equipe técnica para aplicar todas as etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente com dor.
- (E) são consideradas Escalas de Intensidade da Dor: Escala Análoga Visual, Escala de Dor de Faces, Escala Numérica de 0 a 10 de Intensidade da Dor e Escala Descritiva Simples de Intensidade da Dor.

56. Em relação a posição do paciente para o processo cirúrgico, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

Posição	Cirurgias
1. Lateral	( ) Cirurgias de ombro, neurocirurgias de fossa posterior, cirurgias de cabeça e pescoço, cirurgias plásticas de face e nariz, oftalmológicas, cirurgias de mamas.
2. Proclive	( ) Cirurgias de joelho, cirurgias de abdômen superior, colectomias,
3. Trendelenburg	( ) Cirurgias de cisto pilonidal, vasculares, cirurgias de calcâneos, colangio pancreatografias.
4. Prona ou Decúbito Ventral	(A) 2 – 6 – 4 (B) 4 – 3 – 5 (C) 5 – 1 – 2 (D) 1 – 2 – 3 (E) 3 – 5 – 2
5. Supina ou Decúbito Dorsal	(A) 2 – 6 – 4 (B) 4 – 3 – 5 (C) 5 – 1 – 2 (D) 1 – 2 – 3 (E) 3 – 5 – 2
6. Litotomia	( ) Cirurgias de abdômen superior, colectomias, urológicas, gastroplastias, cirurgias de cisto pilonidal, vasculares, cirurgias de calcâneos, colangio pancreatografias.

57. Analise as afirmativas sobre as atribuições da(o) enfermeira(o) no Centro Cirúrgico, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) É função do(a) enfermeiro(a) assistencial encaminhar o paciente para a Sala de Recuperação Anestésica.
- ( ) Não faz parte das atividades técnico administrativas da(o) enfermeira(o) coordenadora participar do planejamento de reformas e/ou da construção da planta física do setor.
- ( ) Dentre as atividades de administração de pessoal da(o) Enfermeira(o) Coordenador(a) estão a definição do perfil do profissional que será admitido e colaborar no ato anestésico.
- ( ) São atividades da(o) Enfermeira(o) Coordenadora relacionadas ao funcionamento da unidade: participar da elaboração de normas, procedimentos e rotinas do setor; elaborar escalas mensais e diárias de atividades dos funcionários.

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – F – F – F.

58. Milhares de brasileiros morrem por ano em consequência das doenças cardíovasculares, dentre elas destacam-se o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e a Insuficiência Coronariana (angina). Existem várias situações clínicas e patológicas dessas doenças que podem gerar uma situação de urgência e emergência. Assinale a alternativa correta acerca do atendimento de emergência a indivíduos em situação de IAM e angina:

- (A) manter o paciente em jejum por até 12 horas para evitar o vômito.
- (B) manter vias aéreas permeáveis, com uso de O<sub>2</sub>, sob cateter nasal até 2 litros/minuto.
- (C) a analgesia e sedação podem ser necessárias durante as crises de angina e infarto em virtude do estresse causado.
- (D) manter o paciente deitado, em decúbito lateral esquerdo, com a cabeceira ligeiramente elevada.
- (E) o uso de nitratos durante as crises de angina e infarto não aliviam a dor, mas podem prevenir novas crises.

59. Sobre as ações de enfermagem para prevenção de infecções do sítio cirúrgico, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Proteger a incisão fechada com curativo estéril por 24 a 48 horas.
- II. Executar a degemação cirúrgica pré-operatória das mãos e os antebraços até os cotovelos por pelo menos 2 a 5 minutos com antiséptico apropriado.
- III. Se o sítio cirúrgico estiver grosseiramente contaminado, deve-se manter a incisão fechada, promovendo uma cicatrização por segunda intenção.
- IV. Usar máscara cirúrgica que cubra parcialmente a boca e o nariz quando entrar na sala cirúrgica, caso o instrumental já esteja exposto ou a cirurgia já tenha começado.

- (A) Somente I e II estão corretas.
- (B) Somente I e IV estão corretas.
- (C) Somente II e III estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

60. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo.

“ \_\_\_\_\_ é o conjunto de ações teóricas e práticas que auxiliam na operacionalização dos processos de trabalho em saúde, na relação profissional/usuário e sua rede social através de parâmetros éticos, humanitários e de solidariedade, reconhecendo o usuário como sujeito e participante ativo no processo de produção da saúde.”

- (A) Humanização
- (B) Deontologia
- (C) Gerenciamento
- (D) Acolhimento
- (E) Triagem

**ENFERMAGEM**

**CONCURSO DE ADMISSÃO – 2015 ao CFO/QC – 2016**

Visto

PAG-25

61. Sobre o atendimento pré-hospitalar de enfermagem à sala de emergência a vítimas de queimaduras, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Não ultrapassar o tempo de dez minutos lavando a área queimada.
- II. No atendimento pré-hospitalar, retirar joias, acessórios e vestimentas, inclusive as que aderiram ao tecido cutâneo lesado.
- III. Nas queimaduras extensas, devem ser utilizados curativos úmidos e frios, com soro fisiológico para evitar a contaminação da lesão.
- IV. No caso de queimadura associada à hemorragia, usar curativo espesso, firme e compressivo no local da lesão.

- (A) Somente I e II estão corretas.
- (B) Somente I e IV estão corretas.
- (C) Somente II e III estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

63. Em relação a ação medicamentosa sobre o estado de Choque, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Dopamina  
( ) Diminui o edema e proporciona melhor resposta inflamatória.
2. Dobutamina  
( ) Vasoconstritora potente que melhora o nível da pressão e resistência vascular sistêmica.
3. Hidrocortisona  
( ) Ácido salicílico
4. Noradrenalina  
( ) Drogas vasoativas que tem melhor resposta no trabalho cardíaco e na congestão pulmonar.
5. Soro Glicosado  
( ) Administrado sobre via endovenosa, é um vasoconstritor periférico elevando a pressão de forma acelerada.

62. As plantas medicinais e fitoterápicos têm recebido crescente importância como recurso terapêutico. Assinale a alternativa que apresenta a legislação vigente que reconhece as Terapias Alternativas, a exemplo da Fitoterapia, como especialidade e/ou qualificação do profissional de Enfermagem aprovado em curso reconhecido por instituição de ensino com carga horária mínima de 360 horas:

- (A) 3 – 2 – 1 – 6
- (B) 3 – 1 – 4 – 6
- (C) 3 – 1 – 2 – 5
- (D) 1 – 2 – 3 – 5
- (E) 2 – 1 – 3 – 6

- (A) Resolução COFEN 197/97.
- (B) Resolução COFEN 326/2008.
- (C) Portaria nº 971, do Ministério da Saúde, de 03 de maio de 2006.
- (D) Portaria nº 2960, do Ministério da Saúde, de 09 de dezembro de 2008.
- (E) Portaria nº 853, do Ministério da Saúde, de 17 de novembro de 2006.

64. Em relação as principais complicações cirúrgicas em pacientes idosos e os cuidados de enfermagem, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

## Complicações

1. Desequilíbrio hidroelectrolítico      ( ) Investigação de edema de sacro, investigação da turidez da pele, determinação do estado urinário, monitoramento cuidadoso da ingestão e eliminação.
  2. Úlcera de Pressão
  3. Pneumonia, atelectasia
  4. Descência e evisceração da ferida
  5. Estados confusionais agudos
- ( ) Deambulação precoce, oxigenoterapia suplementar, troca de posição em hora e hora no pós operatório.
- ( ) Evitar o uso de cateter de demora, monitoramento dos eletrólitos e do equilíbrio hídrico, garantia de oxigenação adequada.

- (A) 2 – 4 – 5  
 (B) 1 – 3 – 5  
 (C) 5 – 3 – 2  
 (D) 4 – 1 – 3  
 (E) 1 – 5 – 2

65. Em relação as principais medicações utilizadas em Saúde Mental, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

## Cuidados de Enfermagem

## Classes

1. Benzodiazepínicos
  2. Antidepressivos
  3. Neurolépticos
  4. Estabilizadores do Humor
  5. Anti-inflamatórios
- ( ) Clorpromazina, Clorperidol, Risperidona. Agem bloqueando a transmissão da dopamina no cérebro, com efeitos motores, hormonais e sobre o pensamento.
- ( ) Citalopram, Fluoxetina, Sertralina. São medicações de uso simples e seguro, sobretudo nos episódios depressivos em pacientes neuroticos.
- ( ) Clonazepam, Midazolam, Clordiazepóxido. Seu sintoma-alvo principal é a ansiedade. Por seu efeito sedativo e relaxante, são muito utilizados para insônia e na síndrome de abstinência tanto de álcool quanto de cocaína ou crack.

- (A) 2 – 3 – 1  
 (B) 4 – 3 – 5  
 (C) 1 – 4 – 3  
 (D) 3 – 2 – 1  
 (E) 3 – 2 – 4

66. A AIDS é uma doença que representa um dos maiores problemas de saúde da atualidade, em função do seu caráter pandêmico e de sua gravidade. Analise as afirmativas sobre as especificidades desta doença, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) O uso do preservativo deve se constituir no único e principal insumo nas ações clínicas e nos serviços que atendem pacientes com HIV/AIDS.
- ( ) Os objetivos do tratamento são: melhorar a qualidade de vida e antecipar a sobrevida, pela redução da carga viral e reconstituição do sistema imunológico.
- ( ) As doenças oportunistas associadas à AIDS são várias, podendo ser causadas por vírus, a exemplo da tuberculose; por bactérias, a exemplo da candidíase; por fungos, a exemplo da pneumocitose; e por protozoários, a exemplo da toxoplasmose.

- (A) V – V – V.  
(B) V – F – V.  
(C) F – V – V.  
(D) F – F – V.  
(E) F – F – F.

67. Sobre as características gerais da Tuberculose, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Gravidez, desnutrição, neoplasias, tratamentos com corticosteróide, não interferem no resultado da prova tuberculínica.
- II. A fala, o espirro e, principalmente, a tosse de um doente de tuberculose pulmonar bacilífera constitui-se meio facilitador para transmissão da doença.
- III. O exame sorológico anti-HIV deve ser oferecido o mais cedo possível a todo indivíduo com diagnóstico estabelecido de tuberculose, independentemente da confirmação bacteriológica.
- IV. Recomenda-se o uso de Rifaampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol, na segunda fase do tratamento, durante quatro meses seguidos, de Rifaampicina e Isoniazida durante dois meses, mantendo dessa forma o regime de curta duração de 6 (seis) meses.

- (A) Somente I e II estão corretas.  
(B) Somente I e IV estão corretas.  
(C) Somente II e III estão corretas.  
(D) Somente II e IV estão corretas.  
(E) Somente III e IV estão corretas.

68. Existem duas crises hipertensivas que exigem prescrição de enfermagem: emergência hipertensiva e urgência hipertensiva. Analise as afirmativas sobre as especificidades destas duas crises, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) As condições associadas às emergências hipertensivas incluem: infarto agudo do miocárdio e hemorragia intracraniana.  
( ) As urgências hipertensivas são caracterizadas por lesão aguda em órgão-alvo. Nestes casos, faz-se necessário o controle imediato da PA, em minutos a horas, para preservar a vida ou a função de órgãos vitais.  
( ) As emergências hipertensivas são tratadas com doses orais de agentes de ação rápida, como os diuréticos de alça (furosemida), os betabloqueadores (propranolol) e os inibidores da enzima conversora de angiotensina (Inderal).

- (A) V – V – F.  
(B) V – F – F.  
(C) V – V – V.  
(D) F – F – V.  
(E) F – F – F.

69. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da manobra de ventilação boca a boca.

- ( ) Utilizar dois dedos para fechar as narinas da vítima, evitando assim que o ar saia durante a realização da manobra, com a outra mão, manter o pescoço hiperestendido.  
( ) Respirar normalmente e colocar os lábios na boca da vítima, vedando-a completamente, impedindo vazamento de ar.  
( ) Hiperestender o pESCOÇO da vítima para cima e para trás, com uma das mãos apoiadas na frente, e com a outra empurrar o mento para cima.  
( ) Afastar os dedos que comprimem a narina para que o ar saia. Havendo pulso, efetue de 10 a 12 ventilações por minuto sem compressões torácicas.  
( ) Ventilar 2 (duas) vezes (cerca de 1 segundo para cada ventilação) a cada 30 (trinta) compressões torácicas e verificar se houve movimento do tórax; se não houve, após algumas tentativas, iniciar a compressão torácica.

- (A) 4 – 2 – 5 – 3 – 1  
(B) 1 – 3 – 2 – 4 – 5  
(C) 3 – 1 – 2 – 5 – 4  
(D) 2 – 3 – 1 – 5 – 4  
(E) 3 – 1 – 4 – 5 – 2

70. Em uma unidade de internamento, foram prescritos 1.000 ml de Soro Glicosado a 5% em NaCl a 0,45% a serem infundidos durante 12 horas. O Conjunto de administração fornece 15 gotas por mililitro. Dessa forma, a velocidade de gotejamento corresponde a:

- (A) 15 gt/min.  
(B) 12 gt/min.  
(C) 21 gt/min.  
(D) 30,85 gt/min.  
(E) 25,12 gt/min.