

PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOSENFERMAGEM

31. Em relação ao uso de vasopressores para ressuscitação conforme as Diretrizes da American Heart Association (2015), analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. A vasopressina em combinação com a epinefrina não oferece nenhuma vantagem como substituto da dose padrão de epinefrina em PCR.
- II. Uma dose de 40 unidades EV/IO de vasopressina pode substituir a primeira ou a segunda dose de epinefrina no tratamento da PCR.
- III. Pode-se administrar epinefrina, tão logo possível, após o início da PCR devido a um ritmo inicial não chocável.
- IV. Em prol da simplicidade, a vasopressina foi incluída do Algoritmo de PCR em mulheres.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I e II estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

32. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo.

“Os _____ são fármacos que reduzem a frequência cardíaca, a pressão arterial e o inotropismo, atuando, assim, sinergicamente, no sentido de diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio.”

- (A) antiplaquetários
- (B) nitratos
- (C) betabloqueadores
- (D) imunossupressores
- (E) anti-inflamatórios

33. Para a avaliação e o tratamento das Síndromes Coronárias Agudas (SCA) no atendimento pré-hospitalar, conforme as diretrizes da American Heart Association (2015), analise as afirmativas, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Recomenda-se que a administração de oxigênio seja mantida em pacientes com possíveis SCA que não apresentem hipoxemia.
- () Profissionais treinados não médicos, podem fazer a interpretação do Eletrocardiograma (ECG) para determinar se o traçado mostra evidências de Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (IAMST).
- () O Eletrocardiograma (ECG) pré-hospitalar de 12 derivações deve ser realizado imediatamente em pacientes com possível SCA.
- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

34. Com base nos principais exames para o esclarecimento diagnóstico de casos suspeitos de Doença Meningocócica, assinale a alternativa correta.

- (A) Cultura de secreção da nasofaringe (SNF); Leucograma; Hemocultura; Exame quimiocitológico do Líquidocefaloraquidiano (LCR); Bacterioscopia direta; Prova do laço.
- (B) Baciloscopia; Hemocultura; Exame quimiocitológico do LCR; Leucograma; Reação em Cadeia da Polimerase (PCR); Cultura de fezes ou vômito.
- (C) Cultura; Exame quimiocitológico do Líquidocefaloraquidiano (LCR); Bacterioscopia direta; Contraimunoeletroforese cruzada (CIE); Aglutinação pelo Látex; Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).
- (D) Baciloscopia; Cultura de secreção da nasofaringe (SNF); Leucograma; Contraimunoeletroforese cruzada (CIE); Aglutinação pelo Látex; Exame quimiocitológico do LCR.
- (E) Raio X de tórax; Prova do laço; Baciloscopia; Cultura de secreção da nasofaringe (SNF); Leucograma; Cultura de fezes ou vômito.

35. A violência é um problema social de grande dimensão que afeta toda a sociedade, atingindo, especialmente, e de forma continuada, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e portadores de deficiência (BRASIL, 2006, p.44). Em relação aos tipos de violência contra a pessoa idosa, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

TIPOS DE VIOLÊNCIA

1. Violência sexual () abrange abusos cometidos em virtude das relações de poder desiguais entre usuários(as) e profissionais dentro das instituições.
2. Violência econômica ou financeira ou patrimonial () se expressa na exploração indevida ou ilegal dos idosos ou ao uso não consentido por eles de seus recursos financeiros ou patrimoniais.
3. Violência institucional () é caracterizado pela falta de atenção para atender às necessidades da pessoa idosa. Ex: não provimento de alimentos adequados, roupas limpas, moradia segura, descuido com a saúde, a segurança e a higiene pessoal.
4. Abandono/negligência () É toda ação ou omissão (agressões verbais ou gestuais) que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa idosa.
5. Violência física (A) 3 – 2 – 4 – 6.
(B) 3 – 1 – 4 – 6.
(C) 3 – 1 – 2 – 5.
(D) 1 – 2 – 3 – 5.
(E) 2 – 1 – 3 – 6.

36. Paciente vítima de grave acidente com motocicleta apresenta fratura de costelas evoluindo com desconforto respiratório, taquicardia e sudorese. Durante intervenção a equipe da emergência identifica pneumotórax extenso do lado direito, sendo necessária drenagem imediata. Assinale a alternativa correta que corresponde ao nome do material adequado a ser utilizado neste procedimento.

- (A) Penrose.
- (B) Heimlich.
- (C) Hemovac.
- (D) Portovac.
- (E) Kher.

37. Ordene os fragmentos de modo que constituam sequência coerente e coesa sobre os procedimentos para administração da vacina contra a febre amarela (atenuada) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Prepare o usuário a ser vacinado.
- () Introduza a agulha na via subcutânea, podendo ser escolhido os locais: a região do deltoide no terço proximal; a face superior externa do braço; a face anterior e externa da coxa; e a face anterior do antebraço.
- () Injete a solução lentamente.
- () Retire a seringa e a agulha com um movimento firme e único.
- () Faça suave compressão no local de administração da vacina com algodão seco.

- (A) 4 – 2 – 5 – 1 – 3
- (B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- (C) 3 – 1 – 2 – 5 – 4
- (D) 2 – 3 – 5 – 4 – 1
- (E) 5 – 4 – 1 – 3 – 2

38. Paciente hospitalizado na unidade de oncologia para tratamento quimioterápico por Leucemia Mieloide Aguda (LMA) evolui com neutropenia. Sobre os cuidados de enfermagem neste caso, analise as afirmativas, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Restringir visitantes gripados, resfriados ou com alguma infecção.
 - () Minimizar procedimentos invasivos.
 - () Comunicar ao médico acerca de quaisquer mudanças nos sinais vitais, particularmente aumento da temperatura - febre.
- (A) V – V – V.
 - (B) V – F – V.
 - (C) F – V – V.
 - (D) F – F – V.
 - (E) F – F – F.

39. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo.

“Termo que abrange vários procedimentos, envolvendo uma abertura cirúrgica na cavidade torácica, esse tipo de cirurgia pode ser uma _____ (retirada total de um pulmão), uma _____ (retirada de um lobo), uma _____ (retirada de um segmento), uma _____ (retirada de uma lesão), uma _____ (remoção parcial de um brônquio) ou uma _____ (diagnóstica).”

(Fonte: CARPENITO-MOYET, L. J. Planos de cuidados de enfermagem e documentação: diagnóstico de enfermagem e problemas colaborativos. 5.ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2011.)

- (A) pneumonectomia – lobectomia – segmentectomia – toracotomia exploratória – ressecção tubular com reconstrução broncoplástica – ressecção em cunha.
- (B) pneumonectomia – lobectomia – segmentectomia – ressecção em cunha – ressecção tubular com reconstrução broncoplástica – toracotomia exploratória.
- (C) segmentectomia – lobectomia – pneumonectomia – ressecção em cunha – ressecção tubular com reconstrução broncoplástica – toracotomia exploratória.
- (D) pneumonectomia – ressecção em cunha – segmentectomia – ressecção tubular com reconstrução broncoplástica – lobectomia – toracotomia exploratória.
- (E) segmentectomia – lobectomia – pneumonectomia – toracotomia exploratória – ressecção tubular com reconstrução broncoplástica – ressecção em cunha.
40. Assinale a alternativa correta que se refere a um sinal ou sintoma de hiponatremia em paciente em diálise peritoneal.
- (A) Taquipneia.
- (B) Polúria.
- (C) Íleo paralítico.
- (D) Hiperglicemia.
- (E) Contrações musculares ou convulsões.

41. Analise as afirmativas sobre os cuidados de enfermagem na infusão de albumina humana, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Administrar a solução a 5% na forma apresentada, mas a solução a 25% deve ser diluída previamente à infusão.
- () Realizar ausculta abdominal durante a infusão pelo risco de aumento da pressão abdominal.
- () Administrar no tempo máximo de 4 horas.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

42. Analise as afirmativas sobre os principais fatores que reforçam a exclusão social dos usuários de drogas, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A ilicitude do uso impede a participação social de forma organizada desses usuários.
- () Inclusão do tráfico como uma alternativa de trabalho e geração de renda para as populações mais empobrecidas, em especial à utilização de mão de obra de jovens neste mercado.
- () O estigma atribuído aos usuários, promovendo a sua segregação social.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

43. Em relação aos padrões respiratórios anormais, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

PADRÃO RESPIRATÓRIO ANORMAL

DESCRIÇÃO

1. Respiração de Kussmaul. () Dispneia periódica; período de respiração profunda alternados com período de apneia.
2. Respiração de Cheyne-Stokes. () Respiração rápida e profunda, sem pausas.
3. Respiração de Biot. () Respiração atáxica: respirações rápidas e profundas com pausas.

- (A) 1 – 2 – 3
- (B) 3 – 2 – 1
- (C) 2 – 1 – 3
- (D) 1 – 3 – 2
- (E) 3 – 1 – 2

44. A maioria dos quadros neurológicos de urgência requerem intervenções cirúrgicas ou tratamento de suporte. A hipertensão intracraniana aguda requer medidas terapêuticas específicas. Sobre pressão intracraniana (PIC), assinale a alternativa correta.

- (A) Os cateteres intracranianos são utilizados para mensurar e monitorizar continuamente a PIC, calcular a pressão de perfusão cerebral e avaliar a complacência e a alta regulação cerebral.
- (B) A PIC é a pressão resultante da presença de três componentes da caixa craniana: componente parenquimatoso, componente liquorico e meninges.
- (C) O valor da PIC varia entre 0 e 25 mmHg.
- (D) A pressão de perfusão cerebral é o resultado da pressão diastólica menos a PIC.
- (E) O único mecanismo de compensação da PIC é o desvio do líquido cefalorraquidiano para o espaço subaracnoide.

45. Alguns pressupostos devem ser considerados como norteadores para fundamentar a organização da rede em saúde mental na perspectiva de acolher, abordar e cuidar de pessoas em situação de crise no território. Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. A internação precisa ser considerada como primeiro e único recurso em situação de crise.
- II. A inclusão e fortalecimento de hospital psiquiátrico no circuito assistencial em saúde mental, permite o atendimento adequado nas situações de crise.
- III. Evitar a internação psiquiátrica e sustentar o usuário no seu contexto de vida com o apoio da Rede de Atenção Psicossocial (Raps).
- IV. Potencializar e qualificar todos os pontos da Rede de Atenção Psicossocial para desenvolver intervenção nas situações de urgência/emergência e no cuidado longitudinal.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I e II estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

46. Assinale a alternativa correta que se refere à lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

- (A) Lei 8.080/90.
- (B) Lei 429/06.
- (C) Lei 1.035/88.
- (D) Lei 9.808/09.
- (E) Lei 2.793/77.

47. Assinale a alternativa correta sobre a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 293/2004, que fixa e estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas unidades assistenciais das instituições de saúde e semelhantes.
- (A) O quantitativo de Enfermeiros para o exercício de atividades gerenciais, educação continuada e comissões permanentes, deverá ser dimensionado de acordo com o quantitativo de leitos da instituição.
 - (B) Para berçário e unidade de internação em pediatria, caso tenha acompanhante, a criança menor de cinco anos e o recém-nascido devem ser classificados com necessidades de cuidados intermediários.
 - (C) Para unidades especializadas como psiquiatria e oncologia, deve-se classificar o cliente tomando como base as características assistenciais específicas, adaptando-as ao Sistema de Classificação de Pacientes (SCP).
 - (D) Deve ser garantida a autonomia parcial do enfermeiro nas unidades assistenciais, para dimensionar e gerenciar o quadro apenas de técnicos de enfermagem.
 - (E) A distribuição de profissionais por categoria deverá seguir o grupo de pacientes de menor prevalência.
48. Sobre os cuidados de controle da hipotermia para manutenção e suporte ao doador de coração, analise as afirmativas, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Fluidos endovenosos em temperatura ambiente ao redor de 20 à 23 °C.
 - () Recomenda-se o aquecimento do ar inspirado do ventilador.
 - () Colchão térmico.
- (A) V – V – V.
 - (B) V – F – V.
 - (C) F – V – V.
 - (D) F – F – V.
 - (E) F – F – F.
49. Paciente tabagista portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) evolui com dispneia e sibilos, sendo prescrito 2 mg de Dexametasona EV. A unidade dispõe de frasco ampola de 2,5 ml com 4 mg/ml. Assinale a alternativa correta que corresponde à quantidade de ml a ser administrada conforme prescrição.
- (A) 2,5 ml.
 - (B) 2 ml.
 - (C) 1 ml.
 - (D) 0,75 ml.
 - (E) 0,5 ml.
50. Sobre as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973 (COFEN 311/2007), analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.
- I. A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
 - II. A multa consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
 - III. A cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
 - IV. A advertência verbal consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- (A) Somente I e III estão corretas.
 - (B) Somente II e III estão corretas.
 - (C) Somente I e II estão corretas.
 - (D) Somente II e IV estão corretas.
 - (E) Somente III e IV estão corretas.

51. De acordo com o enunciado abaixo assinale a alternativa correta:

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, desenvolvida em parceria entre gestores do SUS, sociedades científicas, sociedade civil organizada, pesquisadores, acadêmicos e agências de cooperação internacional, tem como foco da área de atenção à saúde masculina o grupo etário de:

- (A) 13 a 59 anos.
- (B) 15 a 65 anos.
- (C) 17 a 59 anos.
- (D) 18 a 65 anos.
- (E) 20 a 59 anos.

52. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo.

“Considerando que o surto de microcefalia relacionada ao vírus Zika é um evento incomum e inesperado, podendo apresentar impacto grave sobre a saúde pública; que as ações investigativas precisam ser realizadas com urgência, faz-se necessário que os casos suspeitos sejam sinalizados imediatamente ao _____.”

- (A) Registro de Eventos de Saúde Pública (RESP).
- (B) Sistema Nacional de Agravos e Notificação (SINAN).
- (C) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
- (D) Departamento de Atenção Básica (DAB).
- (E) Programa de Controle de Dengue, Chikungunya e vírus Zika (PNCD/SVS/MS).

53. De acordo com o enunciado abaixo, assinale a alternativa correta:

Entre os principais agravos apontados na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas que acometem com maior frequência e severidade as comunidades indígenas encontra-se a:

- (A) Sífilis.
- (B) Hanseníase.
- (C) Dengue.
- (D) Tuberculose.
- (E) Hepatite B.

54. A definição de ações e serviços públicos de saúde já estava clara na Constituição Federal, na Lei 8080/90 e na Resolução nº 322 do Conselho Nacional de Saúde. Contudo, a partir da publicação da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, foi determinado efetivamente quais são as despesas que podem ser consideradas ações e serviços de saúde. A respeito das ações e serviços que são consideradas de saúde nessa Lei, assinale a alternativa correta.

- (A) Limpeza urbana; Merenda escolar; e Vigilância Sanitária.
- (B) Obras de infraestrutura; Vigilância em Saúde; e Remoção de Resíduos.
- (C) Assistência social; Vigilância epidemiológica; e Pagamento de aposentadorias e pensões.
- (D) Vigilância sanitária; Reforma de estabelecimento público de saúde; e aquisição de medicamentos.
- (E) Obras de infraestrutura; Vigilância em saúde; e Saneamento básico.

55. Sobre a assistência de enfermagem ao indivíduo em situação de traumatismo cranioencefálico (TCE), analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Indica-se a passagem de sondagem nasogástrica quando ocorre fratura de base de crânio.
- II. Considerar TCE grave quando a vítima apresentar fratura de crânio com perda de liquor, assimetria das pupilas, afundamento de crânio, dentre outros.
- III. Deve verificar os Sinais Vitais dando atenção especial à Hipotensão acompanhada de diminuição da frequência respiratória e bradicardia.
- IV. Ao admitir o paciente na unidade de emergência, realizar a aspiração nas narinas caso haja lesões faciais.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I e II estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

56. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo.

“ _____ é um instrumento normativo que traz instruções gerais e específicas do funcionamento do serviço, podendo ser mais ou menos detalhados, de acordo com o fim a que se destina.” (SANTOS, 2007).

- (A) Fluxograma
- (B) Regimento
- (C) Manual
- (D) Normas
- (E) Rotina

57. Analise as afirmativas sobre cálculo, distribuição e dimensionamento de pessoal de enfermagem nos diferentes setores de um hospital, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem para assistência semi-intensiva deve ser de 33 a 37% de Enfermeiros (no mínimo 6) e os demais, auxiliares e/ou técnicos de enfermagem.
- () Para efeito de cálculo, devem ser considerados como horas de Enfermagem, por leito nas 24 horas: 9,4 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intensiva.
- () O quadro de profissionais de enfermagem da unidade de internação composto por 60% ou mais de pessoas com idade superior a 50 anos, deve ser acrescido de 10% ao Índice de Segurança Técnica.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

58. No que se refere ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. Em relação a caracterização das infrações éticas e disciplinares previstas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, são consideradas Infrações Gravíssimas: deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função.
 - II. A pena de Multa é aplicável quando infringe-se o sigilo profissional, quando o profissional revela informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.
 - III. São consideradas infrações leves as que ofendem a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.
 - IV. Cabe a(o) enfermeira(o) garantir a continuidade da assistência em um ambiente limpo e seguro, exceto em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de greves da categoria.
 - V. A reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem ocorreu em 2007 e está regulamentada pela Resolução n° 293/2007.
- (A) Somente I, II e III estão corretas.
 - (B) Somente I, III e V estão corretas.
 - (C) Somente I, IV e V estão corretas.
 - (D) Somente II e IV estão corretas.
 - (E) Somente IV e V estão corretas.

59. A avaliação física ou o exame físico é uma parte integrante do histórico de enfermagem. Assinale a técnica fundamental que traduz a aplicação da força física em som e fornece muitas informações a respeito dos processos patológicos do tórax e abdômen.

- (A) Ausculta
- (B) Inspeção
- (C) Palpação
- (D) Percussão
- (E) Sinais Vitais

Ron Gomes da - TC

60. Em relação às complicações agudas e crônicas do Diabetes Mellitus, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

SINTOMAS

1. Hipoglicemia. () Estado de hiperglicemia grave (superior a 600 mg/dl a 800 mg/dL) acompanhada de desidratação e alteração do estado mental, na ausência de cetose.
 2. Cetoacidose. () Emergência endocrinológica decorrente da deficiência absoluta ou relativa de insulina.
 3. Retinopatia Diabética. () Complicação microvascular do diabetes associada com morte prematura por uremia ou problemas cardiovasculares.
 4. Nefropatia Diabética. () Apresenta um quadro variado, com múltiplos sinais e sintomas, dependentes de sua localização em fibras nervosas sensoriais, motoras e/ou autonômicas.
 5. Neuropatia Diabética. () Apresenta um quadro variado, com múltiplos sinais e sintomas, dependentes de sua localização em fibras nervosas sensoriais, motoras e/ou autonômicas.
 6. Síndrome Hiperosmolar. () Apresenta um quadro variado, com múltiplos sinais e sintomas, dependentes de sua localização em fibras nervosas sensoriais, motoras e/ou autonômicas.
- (A) 6 – 2 – 4 – 5.
 (B) 6 – 1 – 4 – 5.
 (C) 5 – 6 – 2 – 3.
 (D) 2 – 1 – 5 – 4.
 (E) 2 – 6 – 4 – 1.

61. A respeito da DOR, considerado o Quinto Sinal Vital, assinale a alternativa correta:

- (A) O limiar de dor consiste no estímulo máximo para o qual a pessoa reporta a dor, sendo a tolerância a quantidade mínima de dor que a pessoa pode suportar.
- (B) A dor da queimadura e a neuralgia pós-herpética são exemplos de dor classificada por localização.
- (C) Experiências progressas com dor, cultura, sexo, idade, ansiedade e expectativas a respeito do alívio da dor, podem aumentar ou diminuir a percepção e a tolerância da dor pela pessoa, bem como afetar as respostas a este quinto sinal vital.
- (D) A depender do padrão e causa, a dor inadequadamente tratada apresenta efeitos lesivos, além do sofrimento que causa.
- (E) A Síndrome da Dor Regional Complexa (CRPS) é caracterizada por dor muscossquelética generalizada, rigidez, fadigabilidade e distúrbio do sono.

62. Entre as pessoas idosas, a demência faz parte do grupo das doenças que acarretam declínio funcional progressivo e perda gradual da autonomia e da independência (BRASIL, 2006). Em relação aos tipos de demência e suas características, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

TIPOS DE DEMÊNCIA

1. Reversível. () Início abrupto com deterioração em graus (alguma recuperação depois da piora) e flutuação do déficit cognitivo. Apresenta sinais focais, de acordo com a região cerebral acometida.
2. Vascular. () Flutuação na cognição, alucinações visuais recorrentes bem formadas e parkinsonismo precoce (rigidez, acinesia e fácies amímic).
3. Doença de Alzheimer. () Início insidioso, perda de memória e declínio cognitivo lento e progressivo. Inicialmente a pessoa apresenta dificuldade para aprender coisas novas e lembrar-se de fatos recentes. Passa a se lembrar de coisas de ocorrerem num passado mais distante.
4. Doença de Pick.
5. Dos corpúsculos de Lewy.

- (A) 1 – 3 – 5
 (B) 4 – 3 – 5
 (C) 4 – 5 – 1
 (D) 2 – 5 – 3
 (E) 2 – 4 – 3

CARACTERÍSTICA DA DEMÊNCIA

63. A respeito dos Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC's) isquêmicos e hemorrágicos, assinale a alternativa correta.

- (A) No acidente vascular cerebral a disfunção motora mais comum é a hemiplegia (fraqueza de um lado do corpo), devido a uma lesão do lado oposto do cérebro. A hemiparesia, ou paralisia de um lado do corpo, é outro sinal.
- (B) O acidente vascular cerebral hemorrágico é comumente chamado de “derrame cerebral”.
- (C) Disartria, Disfagia e Apraxia são as principais disfunções de percepção apresentadas pelos pacientes acometidos pelo Acidente Vascular Cerebral Isquêmico.
- (D) São causas do Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico: aneurisma cerebral, trombose de grandes artérias e embolia cardiogênica.
- (E) Na elaboração do Processo de Enfermagem do paciente que se recupera de um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, podemos encontrar como principais metas: melhora da mobilidade, alívio da privação sensorial e perceptual, prevenção de aspiração, continência do intestino e bexiga, melhora do processo de raciocínio, obtenção de uma forma de comunicação.

64. A respeito das complicações do tratamento por diálise, assinale a alternativa correta.

- (A) A câibra muscular dolorosa pode acontecer, geralmente no início da diálise, quando os líquidos e eletrólitos deixam rapidamente o espaço extracelular.
- (B) A exsanguinação pode acontecer quando as linhas sanguíneas se juntam os as agulhas de diálise são acidentalmente deslocadas.
- (C) A hipotensão pode ocorrer durante o tratamento quando se remove o líquido. Náuseas e vômitos, sudorese, taquicardia e tonteira, são sinais comuns de hipotensão.
- (D) A embolia gasosa pode ocorrer em pacientes com anemia ou cardiopatia arteriosclerótica.
- (E) A dor torácica é rara, mas pode acontecer quando há deslocamento dos líquidos cerebrais. É mais provável acontecer na Insuficiência Renal Crônica.

65. A respeito da assistência de enfermagem a pacientes submetidos à Sondagem Nasogástrica ou Nasoentérica, assinale a alternativa correta:

- (A) Para garantir a segurança do paciente é essencial confirmar que a sonda foi posicionada corretamente. A recomendação exclusiva tem sido a de injetar ar através da sonda, enquanto se ausculta a área epigástrica para detectar as insuflações de ar.
- (B) A aspiração gástrica é o meio exclusivo, utilizado pela(o) enfermeira(o) para verificar se a sonda nasoesteral foi adequadamente posicionada.
- (C) Para garantir a permeabilidade e para diminuir a possibilidade de crescimento bacteriano, formação de crosta ou oclusão da sonda, deve ser administrado 20 a 30ml de água antes de verificar os resíduos e o pH gástrico.
- (D) Quando as sondas de alimentação de pequeno calibre para a infusão contínua são irrigadas depois da administração de medicamento, utiliza-se uma seringa de 30 ml ou mais, tendo em vista que a pressão gerada por seringas menores poderia romper a sonda.
- (E) Para evitar alguns dos sintomas desconfortáveis da Síndrome do Esvaziamento Rápido, al(o) enfermeira(o) deve aconselhar o paciente a permanecer na posição Trendelenburg por 1 hora após a alimentação.

66. Em relação à classificação de cirurgias segundo o potencial de contaminação, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

CLASSIFICAÇÃO DAS CIRURGIAS

1. Cirurgias limpas. () Gastroectomia, Colecistectomia, Prostatectomia.
2. Cirurgias potencialmente contaminadas. () Amigdalectomia, Apendicectomia.
3. Cirurgias contaminadas. () Mamoplastia, Safenectomia, Hemiorrafia.
4. Cirurgias infectadas.
5. Cirurgias potencialmente infectadas.

EXEMPLOS DE CIRURGIA

- (A) 2 – 3 – 1
- (B) 4 – 3 – 5
- (C) 4 – 1 – 2
- (D) 2 – 1 – 3
- (E) 3 – 5 – 1

67. Em relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem no Perioperatório (SAEP), associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

CARACTERÍSTICAS

- () Nesta fase se aplica a prescrição de enfermagem com avaliação e evolução.
- () Nesta fase elabora-se o histórico de enfermagem, o exame físico, os diagnósticos e as prescrições de enfermagem.
- () Nesta fase, deve-se utilizar um instrumento específico da SAEP e encaminhar o paciente a unidade de origem.
- () Nesta fase recomenda-se que seja feita uma visita pelo enfermeiro do Centro Cirúrgico a fim de verificar os resultados dos cuidados prestados para a evolução de cura do paciente. Esta fase compreende desde o momento em que o paciente é recebido na unidade de Centro Cirúrgico até sua saída da sala de operação.

- (A) 2 – 1 – 3 – 4.
 (B) 3 – 1 – 4 – 5.
 (C) 3 – 4 – 1 – 2.
 (D) 4 – 1 – 5 – 5.
 (E) 4 – 2 – 3 – 1.

68. Sobre a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), assinale a alternativa correta:

- (A) A enfermeira deve mudar frequentemente a posição do paciente para melhorar a ventilação e a perfusão nos pulmões e estimular a drenagem da secreção.
- (B) A oxigenação no paciente com SARA é melhorada na posição de decúbito dorsal.
- (C) É importante reduzir a ansiedade do paciente porque este prejudica o repouso e diminui o dispêndio de energia.
- (D) Overdose, Pneumonia bacteriana, Choque, Traumatismo Craniano não são fatores etiológicos relacionados com a SARA.
- (E) A fase crônica da SARA é marcada por um abrupto início de dispnéia intensa que ocorre 12 a 48 horas depois do evento deflagrador.

69. Sobre o Protocolo Universal para prevenção de erros relacionados ao local errado, paciente errado e procedimento errado, na atenção cirúrgica, assinale a alternativa correta.

- (A) Na demarcação do Sítio Cirúrgico uma cruz ou “X” deve ser realizado a fim de evitar má interpretação como se o local sinalizado não fosse para ser operado.
- (B) A demarcação deve ser claramente visível, sem ambiguidades e feita com um marcador permanente nos sítios não-operatórios.
- (C) A(O) enfermeira(o), responsável pelo Centro Cirúrgico, deve demarcar o local da cirurgia em casos envolvendo lateralidade ou múltiplas estruturas ou níveis(por exemplo: dedo da mão ou pé)
- (D) É atribuição exclusiva da Enfermagem confirmar se o paciente assinou o consentimento informado para o procedimento.
- (E) Antes da indução anestésica, um membro da equipe deve confirmar se o paciente esta corretamente identificado. A identidade deve ser confirmada não apenas pelo nome, mas também por um segundo identificador como PR exemplo: a data de nascimento.

70. Analise as afirmativas sobre procedimentos e protocolos relacionados a Curativos no ambiente hospitalar, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Curativo oclusivo é aquele no qual se utiliza apenas antisséptico, mantendo a ferida seca. Ex: ferida cirúrgica limpa com 48 horas de evolução ou mais.
- () Após a epitelação da ferida, deve-se deixá-la coberta caso não haja chance de contaminação pelas áreas vizinhas.
- () Curativos úmidos, seja por secreção ou banho, devem ser trocados quantas vezes forem necessárias, não ultrapassando o tempo de 6 horas.

- (A) V – V – V.
 (B) V – F – V.
 (C) F – V – V.
 (D) F – F – V.
 (E) F – F – F.

FINAL DA PROVA